

P. cyanescens “Copelandia Hawaiian”

PADDESTOEL KWEEEEKSET

Instructies:

1. Open de doos en haal de inhoud eruit. De doos bevat:

- 1 kweekset
- 1 kweekzak
- 1 bekertje met toplaag (casinglaag)

2. Was je handen goed met water en zeep. We raden aan om latex handschoenen en (alcoholische) handdesinfectiegel te gebruiken. Draag eventueel een mondkapje. Verdeel de toplaag gelijkmatig over het substraat. Dit kun je het beste met je handen doen terwijl je schone latex handschoenen draagt. Plaats daarna de kweekset in de bijgeleverde kweekzak.

3. Terwijl de kweekset in de kweekzak staat, kun je de toplaag grondig besproeien zodat deze **goed vochtig** is (maar niet doorweekt!). Besproei ook de binnenkant van de zak. Zorg ervoor dat er voldoende verse lucht in de zak zit en sluit hem met een paperclip.

4. Blijf dagelijks (1 tot 2 keer per dag) de toplaag en de binnenkant van de kweekzak besproeien. Knijp voorzichtig in de zak om oude lucht te verwijderen en verse zuurstof toe te voegen. Het is in deze fase erg belangrijk dat de toplaag en de kweekzak vochtig blijven.

5. Na 6 tot 11 dagen beginnen de paddenstoelen te vormen (pins). Haal op dat moment de kweekset uit de zak, besproei de binnenkant van de zak en ververs de lucht. Cyanescens reageren namelijk slecht op direct contact met water. Zet de kweekset daarna weer terug in de zak.

Het kan gebeuren dat de paddenstoelen bij de eerste flush wat langzamer groeien of kleiner zijn. Als dit gebeurt, haal dan de kweekset uit de zak en giet 1–2 cm water in de zak. Na een dag of twee zal de groei weer op gang komen.

6. De paddenstoelen zijn 5 tot 7 dagen na het pinnen klaar om geoogst te worden. Oogst ze 24–36 uur nadat de zwarte sporen beginnen te vallen. In tegenstelling tot Cubensis is het bij Cyanescens beter om ze wat langer te laten rijpen. Pluk de paddenstoelen door ze voorzichtig om te duwen tot de steel aan de onderkant breekt.

7. Na het oogsten moet je de toplaag weer goed vochtig maken door **grondig te besproeien** vanaf ongeveer 10 cm afstand. Het is niet erg als er een centimeter of twee water onderin de kweekzak blijft staan. De tweede flush zal nu beginnen. Houd de zak vochtig, maar vermijd altijd het besproeien van de nieuwe paddenstoelen.

COPELANDIA KWEEKPARAMETERS:

FASE 1: VORMING VAN PRIMORDIA

Starttemperatuur: 21–26°C

Relatieve luchtvochtigheid: 95–100%

FASE 2: ONTWIKKELING VAN PADDENSTOELICHAMEN

Temperatuur: 21–26°C

Relatieve luchtvochtigheid: 90–95%

KRACHT VAN COPELANDIA MAGIC MUSHROOMS

Cyanescens paddo's zijn ongeveer vijf keer sterker dan Cubensis. Houd hier rekening mee bij het bepalen van de juiste dosering. Begin altijd met een lage dosis en gebruik verstandig.